

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°126
du 29 Juillet 1988

VIGNE

Un temps très sec et chaud s'est installé depuis le 15 juillet et on observe les premiers grains vérés.

** mildiou

Compte tenu des conditions climatiques, les repiquages ne sont plus à craindre, mais les dégâts sont importants tant sur feuilles, que sur grappes dans la majorité des parcelles de la plaine orientale. Ne plus utiliser les anilides et revenir aux produits contenant une matière active pénétrante ou un produit de contact. La protection doit être maintenue jusqu'à la **veraison**.

** botrytis

Le traitement au stade "**tout début veraison**" est à réaliser sur toutes les parcelles sensibles et les cépages à grappes serrées ; ce traitement est **indispensable**, compte tenu des conditions climatiques passées, du rôle préventif de ce traitement et de l'état des grappes déjà fortement attaquées par le mildiou et les tordeuses de la grappe.

Effectuer un seul traitement trois semaines avant la récolte lorsque la pourriture grise est installée n'aura pratiquement aucune efficacité !

Sur toutes les parcelles sensibles préférer un imide cyclique
KIDAN, 3 l/ha, ROVRAL 1,5 kg/ha, SUMISCLEX 1,5 kg/ha, SUMISCLEX liquide à 1,5 kg/ha, RONILAN FL 1,5 l/ha.

Ailleurs vous pouvez utiliser des produits classiques
à ce stade BASULTRA, B.T.F, CODICAP L, EUPARENE, MYCODIFOL L, ORGANIL 648
QUINARIS M

P.1.50

**** cicadelles vertes**

Les populations continuent à augmenter, mais le seuil de traitement n'est pas encore atteint dans la plupart des situations (seuil = 50 larves pour 100 feuilles).

**** cochenilles farineuses**

De nombreux foyers sont visibles et les larves sont abondantes sous les feuilles. Dès maintenant réalisez un traitement avec de l'EKALUX, de l'ULTRACIDE ou des produits à base de parathion.

PECHER NECTARINIER =====

**** Maladies de conservation**

Pour les variétés tardives, réaliser une à deux interventions dans le mois précédant la récolte avec un des produits suivants.

| | | <u>Délai</u> |
|-----------------|-----------------|--------------|
| - benomyl | BENLATE | 0 |
| - triforine | SAPROL, DENARIN | 0 |
| | FUNGINEX | |
| - vinchlozoline | RONILAN | 0 |
| - procymidone | SUMISCLEX | 8 jours |
| - iprodione | KIDAN, ROVRAL | 15 jours |

**** cochenilles du mûrier**

Dans les vergers très infestés, une intervention sera effectuée dès maintenant sur les larves de deuxième génération.

**** tordeuse orientale**

Renouveler la protection pour les variétés à récolter tardivement

: Attention: délais d'emploi :
: avant récolte :

OLIVIER =====

**** mouche de l'olive**

Rappel : la méthode de lutte par insecticide et attractif doit être mise en oeuvre dès que l'on démontre en moyenne **une capture de mouche** par piège et par jour.